

● THUNDERBIRD® SYBR® qPCR Mix的使用条件 [Stratagene(Agilent Technologies) Mx3005P]

(1) 反应液的配置

下面是按 25 μ l、20 μ l 体系进行反应的例子。

试剂	25 μ l 反应	20 μ l 反应	最终浓度
无菌水	X μ l	X μ l	
THUNDERBIRD® SYBR® qPCR Mix	12.5 μ l	10 μ l	1x
Forward Primer	7.5 pmol	6 pmol	0.3 μ M*1
Reverse Primer	7.5 pmol	6 pmol	0.3 μ M*1
50X ROX reference dye	0.05 μ l	0.04 μ l	0.1x
DNA溶液	Y μ l	Y μ l	
总体积	25 μ l	20 μ l	

*1: 在扩增效率不高的情况下增加引物浓度, 或者在发生非特异性扩增的情况下(用低浓度模板进行反应时, 扩增曲线的起峰较差)降低引物浓度, 反应结果可能会改善。引物终浓度的参考值为0.2~0.6 μ M。

(2) PCR循环条件设置

步骤	温度	时间	升降速率
预变性	95° C	60秒	最大
PCR (40 cycles)	变性 60° C*2	15秒 60秒	最大 最大

(Data Collection请设定在延伸步骤)

溶解曲线分析(Melting / Dissociation Curve Analysis)

*2: 扩增效率不高的情况下, 可降低温度, 发生非特异性反应(用低浓度模板进行反应时, 扩增曲线的起峰较差)时, 可提高温度, 由此可改善反应结果。温度范围参考值为56~64° C。

东洋纺(上海)生物科技有限公司

上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场28楼AL单元

邮编: 200122

交货期限 • 订货相关咨询

Tel:021-5879-4900 Fax:021-5879-4901

E-Mail: sales@bio-toyobo.cn

产品内容 • 技术相关咨询

Tel:021-5879-4142 Fax:021-5879-5259



E-Mail: tech@bio-toyobo.cn

<http://www.bio-toyobo.cn>